

# Lietuvos vaikų skiepijimų kalendorius

	Iki 24 val.	2-3 paros	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	12-15 mėn.	15-16 mėn.	18 mėn.	6-7 metai	11 metų	15-16 metų
1.	Tuberkuliozės vakcina		BCG											
2.	Hepatito B vakcina	HepB*		HepB				HepB						
3.	Kokliušo, difterijos, stabiligės vakcina				DTaP		DTaP		DTaP		DTaP	DTaP		DTaP
4.	B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina				Hib		Hib		Hib		Hib			
5.	Poliomielito vakcina				IPV		IPV		IPV		IPV	IPV		
6.	Pneumokokinės infekcijos vakcina			PCV		PCV			PCV**					
7.	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina									MMR**		MMR		
8.	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina (mergaitėms)												HPV1 HPV2***	
9.	B tipo meningokokinės infekcijos vakcina				MenB		MenB		MenB**					
10.	Rotavirüsinės infekcijos vakcina		RV		RV		RV****							

1. Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HB – hepatito B vakcina, DTaP – kokliušo (nelastelinio), difterijos, stabiligės vakcina, Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina, Td – difterijos, stabiligės (suaugusiųjų) vakcina, IPV – inaktivuota poliomielito vakcina, MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina. 2. HB\* pirma dozė turi būti įskiepima naujagimiui per 24 val. po gimimo. 3. 12 metų amžiaus vaikai HB vakcina skiepijamai 3 dozėmis pagal schema: HB1; po 1 mėnesio – HB2; po 6 mėnesių – HB3. 12 metų vaikams HB\*\* vakcina skiriama, jei jie neskieptyti kūdikystėje. MMR vakcina skiriama su pirmaja HB vakcinos doze. 4. 12 metų vaikams MMR\*\*\* skiriama, jei jie neskieptyti 6–7 metų amžiuje. 5. Skiepijimai atliekami pagal vaisto charakteristikos santrauką. 6. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinių skyrimo tvarką, galimas nepageidaujanas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti vaiko sveikatos raidos istorijoje (forma Nr. 025-112/a).